

Geraadpleegde literatuur:

P. Cleij, H. Visser, Planbureau voor de Leefomgeving. 2010. Nutriënten in het Nederlandse zoete oppervlaktewater: toestand en trends. Den Haag/Bilthoven, PBL-publicatienummer 500208001

Pollux, Bart. 2002 .Visjes kijken, kan dat? Onderwater waarnemingen als methode voor ecologisch onderzoek. RAVON tijdschrift nr. 14, p. 17-21

Ogden, J.C. & Buckman, N.S., 1973. Movements, foraging groups, and diurnal migrations of the striped parrotfish *Scarus croicensis* Bloch (Scaridae). *Ecology* 54, p. 589-596.

P. Cleij, H. Visser, Planbureau voor de Leefomgeving. 2010. Nutriënten in het Nederlandse zoete oppervlaktewater: toestand en trends. Den Haag/Bilthoven, PBL-publicatienummer 500208001

M.Casalini, M. Agbali, M. Reichard, A. Bryjova, C. Smith., 2008. Male dominance, female mate choice, and intersexual conflict in the rose bitterling (*Rhodeus ocellatus*). *Journal compilation 2009 The Society for the Study of Evolution.*, *Evolution* 63-2, p. 366–376

Suzanne C. Mills · John D. Reynolds, 2003. Operational sex ratio and alternative reproductive behaviours in the European bitterling, *Rhodeus sericeus*. *Behavioral Ecology and Sociobiology* (2003), no. 54, p. 98–104

Carl Smith and Martin Reichard, 2005. Females solicit sneakers to improve fertilization success in the bitterling fish (*Rhodeus sericeus*) *Proceeding of the Royal. Society.* (2005)